# Liebes Praxisteam,

**um Ihre AIT noch besser zu begleiten, haben wir mit der Überarbeitung unseres Produktportfolios auch den Ergebnisberichten ein übersichtlicheres Layout verpasst.** Der PadoTest® enthält ab sofort immer die Bestimmung der *Aa*-Serotypen, welche mit PadoSero jetzt auch als separates Produkt verfügbar ist.

## Übersichtliche Berichtsbereiche

**Ergebnis:** Zeigt die Zusammenfassung des Analyseresultats auf einen Blick, mit der Typenbewertung und dem Serotypenstatus.

**Nachweis:** Enthält die detaillierten Resultate zu nachgewiesenen Parametern, wie Bakterien, Gesamtkeimzahl und Serotypen.

**Empfehlung:** Dem Analyseergebnis entsprechende Maßnahmen – inklusive Adjuvanz/Antibiose, wenn indiziert.

**Einfache Typeneinteilung beim PadoTest®**
Leicht verständliche Einteilung nach Therapieschwellen in Ampelfarben aufgrund der Bakterienbelastung, von „**1: Monitoring**“, über „**2: Therapie**“ bis „**3: Therapie Plus**“.

**Serotypenbestimmung bei PadoSero**
Für rein klinische AB-Entscheidungen unterstützt **PadoSero**, ob Amoxicillin zusätzlich indiziert ist.

**Achtung: Die vollen Produktvorteile erhalten Sie nur mit den aktuellen Probenahme-Sets!**

Der Vertrieb für Deutschland und die EU erfolgt jetzt direkt aus unserem Labor in Leipzig und für die Schweiz neu aus Luzern. Alle Informationen erhalten Sie auch von unserem Experten-Team und finden Sie im Internet auf **www.iai-test.de**.

## PadoTest® – Ab sofort immer inklusive der Bestimmung der *Aa*-Serotypen (PadoSero)



# PadoSero – Unsere *Aa*-Serotypendiagnostik nun auch als separates Produkt




**Zusammenfassung**
Das Wichtigste auf einen Blick

***Aa*-Konzentration, Serotyp-Details Gesamtkeimzahl (TBL)**

**Therapeutische Konsequenz**
Maßnahmen/Adjuvanzien gemäß *Aa*-Serotyp

Den **ausführlichen Leitfaden** zur **Interpretation der Ergebnisse** inklusive der **AB-Dosierungen** und **-Wirksamkeitsprofile** finden Sie auf jeder **Berichtrückseite**:

| | Typ | Serotyp | Mikrobiologischer Status | Maßnahmen & Adjuvantien/Antibiotika |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring | 1 | - | Mikrobiologisch befriedigend | Kein AB notwendig, Monitoring beibehalten |
| Therapie | 2 | - | Geringes Vorkommen strikter und fakultativer Anaerobier, fallweise fakultative Anaerobier UND nicht virulenter Serotyp | In Abhängigkeit vom klinischen Bild ist eine AIT ausreichend |
| Therapie Plus | 3 | - | Therapierelevantes Vorkommen strikter Anaerobier, fakultative Anaerobier (Aa) abwesend | AIT + AB: Metronidazol (3 x 400-500 mg tägl., 7 Tage) |
| | | a | Therapierelevantes Vorkommen strikter Anaerobier + fakultativer Anaerobier (Aa) UND nicht virulenter Serotyp | AIT + AB: Metronidazol (3 x 400-500 mg tägl., 7 Tage) |
| | | b-f | Therapierelevantes Vorkommen strikter Anaerobier + fakultativer Anaerobier (Aa) UND virulenter Serotyp | AIT + AB: Metronidazol + Amoxicillin (3 x 400-500 mg + 3 x 500 mg tägl., 7 Tage) |
| | | - | Therapierelevantes Vorkommen strikter Anaerobier + fakultativer Anaerobier (Aa) UND Serotyp nicht bestimmbar | AIT + AB: Metronidazol + Amoxicillin (3 x 400-500 mg + 3 x 500 mg tägl., 7 Tage) |
| | | b-f | Kein therapierelevantes Vorkommen strikter Anaerobier; fakultativer Anaerobier (Aa) UND virulenter Serotyp | AIT + AB: Amoxicillin 500 mg (3 x 500 mg tägl., 7 Tage) |

Entscheidung zur Antibiotikagabe obliegt der behandelnden Zahnärztin/dem behandelnden Zahnarzt

**PadoTest® inkl. PadoSero**
Status, Typeneinteilung & Therapieempfehlungen

**AB-Dosierungen**
inkl. Wirksamkeitsprofilen & Kontraindikationen

| Wirkstoff | Dosierung für Erwachsene | Wirksamkeit | Cave |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin | 3 x 500 mg tägl., 7 Tage | Fakultative Anaerobier wie *Aa* | Penicillin-Allergiker |
| Metronidazol | 3 x 400-500 mg tägl., 7 Tage | Strikte Anaerobier wie *Tf, Td, Pg, Pi* und *Fa* | ZNS-Erkrankungen, Wechselwirkungen mit Alkohol und Antikoagulantien vom Coumarin-Typ |
| Ornidazol (statt Metronidazol) | 2 x 500 mg tägl., 10 Tage | Strikte Anaerobier wie *Tf, Td, Pg, Pi* und *Fa* | ZNS-Erkrankungen |
| Clindamycin (statt Metronidazol) | 2 x 600 mg tägl., 7 Tage | Strikte Anaerobier wie *Tf, Td, Pg, Pi* und *Fa* | |
| Ciprofloxacin (statt Amoxicillin) | 2 x 250 mg tägl., 10 Tage | Fakultative Anaerobier wie *Aa* | Nicht bei schwangeren und stillenden Frauen, sowie Kindern und Jugendlichen bis Ende Wachstumsphase einsetzen. |
| Doxycyclin | 1. Tag 200 mg, danach 1 x 100 mg tägl., 18 Tage | Fakultative und strikte Anaerobier | Kann Photosensibilität auslösen: Sonnen- oder andere UV-Bestrahlung während der Medikation vermeiden. |
| **Präparatkombinationen** | | **Dosierung für Erwachsene** | |
| Metronidazol[2] + Amoxicillin | | 3 x 400-500 mg + 3 x 500 mg täglich, 7 Tage | |
| Metronidazol + Ciprofloxacin[3] | | 2 x 400-500 mg + 2 x 250 mg täglich, 7 Tage | |

**Kostenfreie Hotline:** 00800 32 32 62 62 | **E-Mail:** info@iai-test.de | **Web:** www.iai-test.de

Rev.1_V2025-07