

Zapytaj swojego
stomatologa
o **testy iai**



**Co
możesz zrobić?**

Zapalenie przyzębia w większości przypadków jest chorobą możliwą do opanowania. Wymaga to jednak Twojego stałego zaangażowania. Przestrzegaj zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej oraz regularnie korzystaj z wizyt kontrolnych i terminów wspomagającej terapii zapalenia przyzębia. Tylko wtedy możliwy jest długotrwały sukces leczenia.

Ekspertyza w diagnostyce stomatologicznej

Bezpłatna infolinia: 00800 32 32 62 62

E-mail: info@iai-test.de

Strona internetowa: www.iai-test.de

Dystrybucja:

Niemcy, UE i świat:

ParoX GmbH, Deutscher Platz 5, 04103 Lipsk, Niemcy

Tel.: +49 (0) 341 / 149 59 19, Fax: +49 (0) 341 / 149 59 59

Pieczątka gabinetu



www.iai-test.de

PadoTest®
PadoSero PadoGen
PadoBiom®

Zapytaj
w swoim
gabiniecie
stomatologicznym
o **testy iai**

ZAPALENIE PRZYŻĘBIA
Identyfikacja bakterii

Analizy laboratoryjne
dla terapii zorientowanej na pacjenta.

Czym jest zapalenie przyzębia?



Zapalenie przyzębia to zapalna choroba aparatu zawieszeniowego zęba. Powstaje w wyniku działania chorobotwórczych bakterii w kieszonkach dziąsłowych oraz reakcji zapalnej organizmu.

Jakie są objawy?

Zapalenie przyzębia prawie zawsze zaczyna się od zapalenia dziąseł (gingivitis), które objawia się krwawieniem dziąseł (np. podczas szczotkowania), nieświeżym oddechem lub rozchwieaniem zębów. Jeśli zauważysz u siebie takie objawy, koniecznie umów się na wizytę w gabinecie stomatologicznym. Tylko tam można stwierdzić, czy występuje poważna choroba, czy wystarczyć dodatkowe środki higieniczne.

Jakie są skutki?

W wyniku choroby dochodzi do utraty kości szczęki, a w przypadku braku leczenia – do utraty zębów. Zapalenie przyzębia ma także negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia. Badania wykazały, że zapalenie przyzębia wiąże się z wysokim ryzykiem miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu, istnieje też zależność między cukrzycą a zapaleniem przyzębia oraz prawdopodobieństwo wywołania przedwczesnych porodów. Dyskutowany jest również związek z reumatyzmem, chorobami płuc, nowotworami i demencją.

Co robi stomatolog?

Osady na powierzchni zębów prowadzą do zapalenia dziąseł. Powstaje wtedy szczelina między zębem a dziąsłem, zwana kieszonką dziąsłową. Poprzez pomiar głębokości kieszonki za pomocą sondy periodontologicznej, ocenę skłonności do krwawienia oraz zdjęcia rentgenowskie pokazujące utratę kości, stomatolog może stwierdzić, czy występuje zapalenie przyzębia.

Jak pomaga analiza?

Zakres koniecznych działań terapeutycznych zależy od stadium choroby i obciążenia bakteryjnego.

Testy iai to analizy molekularne, które pozwalają określić istotne dla terapii obciążenie bakteryjne i wspierają indywidualne działania terapeutyczne.

Testy iai mają trzy główne zalety

- ✓ Unikanie antybiotyków, jeśli nie przynoszą dodatkowych korzyści
- ✓ Skrócenie terapii, ponieważ antybiotyki są stosowane natychmiast, gdy są konieczne
- ✓ Wczesne wykrywanie zmian w mikrobiomie

www.iai-test.de

Jakie testy iai są dostępne?

PadoBiom®

PadoBiom® bada stosunek bakterii zdrowotnych do chorobotwórczych i informuje o symbiozie lub dysbiozie mikrobiomu. Dodatkowo analizuje obecność genów oporności na antybiotyki. Dzięki temu można zapobiegać chorobom przyzębia, rozpoznać szybkie postępy choroby (progresję) i unikać niepotrzebnego stosowania antybiotyków.

PadoTest®

PadoTest® koncentruje się na obciążeniu patogennymi (chorobotwórczymi) bakteriami wskaźnikowymi. Wynik służy do wyboru odpowiedniego i uniknięcia zbędnego stosowania antybiotyków.

PadoSero

PadoSero pomaga w przypadku koniecznej klinicznie antybiotykoterapii ograniczyć stosowanie substancji czynnych do niezbędnego minimum.

PadoGen

PadoGen bada genetyczną skłonność do stanów zapalnych i umożliwia uwzględnienie tego w terapii.

Dostępny tylko w Niemczech i Austrii

Koszty badań mikrobiologicznych nie są obecnie refundowane przez ustawowe kasy chorych. Twój gabinet stomatologiczny poinformuje Cię o ewentualnych kosztach. Przed badaniem należy sprawdzić możliwość zwrotu kosztów przez prywatne lub dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne.